Trnavskí poľnohospodári

Trnavskí poľnohospodári nemajú priaznivú jar. Kým napríklad cyklistom či milovníkom prírody teplé počasie uplynulých dní vyhovovalo, pestovatelia majú už niekoľko týždňov hlavu v smútku. Akútny nedostatok zrážok, silný vietor a na toto ročné obdobie neobvykle vysoké teploty ohrozujú vzchádzajúcu úrodu poľnohospodárskych plodín.

Aj takto vyzerá pôda v oblasti Maduníc

Pôda je vysušená, zem praská, plodiny majú problém prijímať dostatok živín, sú nízke a vysychajú. Niektoré nerovnomerne vzchádzajú a bude otázne, akú dajú po lete vlastne úrodu.

Poľnohospodári sa snažili zachytiť čo najviac zostávajúcej zimnej vlahy v pôde a preto už koncom februára siali jačmene, začiatkom marca cukrovú repu, hneď na to kukuricu, slnečnicu, hrach a strukoviny. Neobvykle skoro pustili aj závlahy na zeleninu.

„Tento rok je jar extrémne suchá, normálny, niekoľko dní trvajúci dážď sme v našej lokalite ešte nemali. Najhoršie je, keď musíme polievať plodinu hneď, ako ju zasejeme do pôdy. Dnes zavlažujeme najmä špeciálne plodiny, napríklad cibuľu, zemiaky“, hovorí predseda Regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory v Trnave Oliver Šiatkovský.

Závlahy naplno polievajú najmä špeciálne plodiny

Nedostatok zrážok potvrdzujú viacerí poľnohospodári z trnavského kraja. Napríklad v Maduniciach napršalo v marci a apríli dokopy len 12 mm. V Drahovciach namerali v marci 16,5 mm zrážok, v apríli len 12,5 mm. Hodnoty klesli výrazne pod 30-ročný priemer. V lokalite Cífer spadlo za posledných 5 týždňov len 8 mm. Silný vietor navyše pôsobí ako fén: okamžite vyfúka z pôdy preč aj ten najmenší dážď.

Trnavskí región preverí v tomto roku okrem jarného počasia aj počet hraboša poľného v porastoch. Po miernej zime veľká časť populácie prežila, čo dáva predpoklad na jej výraznú reprodukciu. Vyplýva to z jarného monitoringu hrabošov v trnavskom a hlohoveckom regióne, ktorý robia výskumníci z Katedry ekológie a environmentalistiky Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

„Toto nie je štandardná situácia. Súčasný počet škodcov dáva predpoklad ku kalamitnému výskytu hraboša poľného na konci tohto roka“, uviedol Ivan Baláž z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

V tomto období sa hraboše nachádzajú v porastoch repky. Keďže je vysoká, dravce sa k hrabošom už nevedia dostať. Keď repku poľnohospodári pokosia, hraboše sa presunú do obilia, kde budú robiť ďalšie škody na úrode.

Systémovými opatreniami, vyčlenením finančných prostriedkov a zvýšením populácie dravcov by sa v budúcnosti mohlo zabrániť premnoženiu hraboša.